Table 2b. To Part 660, Subpart C - 2014, and Beyond, Allocations by Species or Species Group. (Weights in Metric Tons)

Species	Fishery HG	Allocations			
		Trawl		Non-trawl	
		%	Mt	%	Mt
Arrowtooth flounder	3,671	95%	3,487	5%	184
Bocaccio - S of 40°10' N. lat. a/	328.6	NA	79.0	NA	249.6
Canary rockfish a/ b/	101.5	NA	54.1	NA	47.4
Chilipepper - S of 40°10 N. Lat.	1,423	75%	1,067	25%	356
Cowcod - S of 40°10' N. lat. a/	2.9	NA	1.0	NA	1.9
Darkblotched rockfish c/	309.2	95%	293.7	5%	15.5
Dover sole	23,410	95%	22,240	5%	1,171
English sole	5,543	95%	5,266	5%	277
Lingcod					
N of 40°10' N. lat.	2,600	45%	1,170	55%	1,430
S of 40°10' N. lat.	1,054	45%	474	55%	580
Longnose skate a/	1,928	90%	1,735	10%	193
Longspine thornyhead					
N of 34°27' N. lat.	1,912	95%	1,816	5%	96
Minor shelf rockfish north a/	903	60.2%	543	39.8%	359
Minor slope rockfish north	1,098	81%	889	19%	209
Minor shelf rockfish south a/	668	12.2%	81	87.8%	587
Minor slope rockfish south	601	63%	379	37%	222
Other flatfish	4,682	90%	4,214	10%	468
Pacific cod	1,191	95%	1,131	5%	60
POP - N of 40°10' N. lat. d/	136.5	95%	129.7	5%	6.8
Pacific whiting	TBA	100%	TBA	0%	TBA
Petrale sole a/	2,418.0	NA	2383.0	NA	35.0
Sablefish					
N of 36° N. lat.	See Table 1c of this subpart				
S of 36° N. lat.	1,555.0	42%	653	58%	902
Shortspine thornyhead					
N of 34°27' N. lat.	1,466	95%	1,393	5%	73
S of 34°27' N. lat.	351	NA	50	NA	301
Splitnose - S of 40°10 N. Lat.	1,658	95%	1,575	5%	83
Starry Flounder	1,521	50%	761	50%	761
Widow e/	1,411	91%	1,284	9%	127
Yelloweye rockfish a/	12.2	NA	1.0	NA	11.2
Yellowtail - N of 40°10 N. Lat.	3,681	88%	3,239	12%	442